



GASTROSKOPIA INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE

IMIĘ I NAZWISKO PESEL

Szanowni Państwo!

Zaproponowane Państwu badanie endoskopowe ma na celu wyjaśnienie przyczyny Państwa dolegliwości, tym samym zwiększy szansę na skuteczną terapię. Chcielibyśmy, abyście Państwo zostali poinformowani o tym jak należy przygotować się do badania, jaki jest jego przebieg oraz o niewielkim, związanym z tym badaniem ryzykiem powikłań a następnie dobrowolnie wyrazili świadomą, pisemną zgodę na przeprowadzenie badania.

Wskazania do badania:

- Podejrzenie choroby wrzodowej lub dwunastnicy;
- Podejrzenie choroby nowotworowej;
- Dysfagia- trudności w przełykaniu;
- Krwawienie z przewodu pokarmowego;
- Zgaga, bóle w nadbrzuszu;
- Niedokrwistość, spadek masy ciała;

Przygotowanie do badania:

- Żołądek powinien być całkowicie opróżniony;
- **Na 6-8h przed badaniem nie należy jeść;**
- **Na 4h przed badaniem nie należy palić papierosów;**
- **Na 2-3h przed badaniem nie należy pić;**

WAŻNE!

Pacjenci zażywający leki rozrzedzające krew (Acard, Polocard, Aspiryna, Acenocumarol, Syncumar, Syncrom, Ticlid) i inne stosowane po założeniu stentów powinni w porozumieniu z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem odstawić leki **na 5 dni przed badaniem lub zamienić je na heparyny drobnocząsteczkowe. Jest to spowodowane koniecznością wykonania biopsji podczas badania. Zażywane leki w niektórych przypadkach mogą być odstawione, zaś leki zażywane w chorobach serca, nadciśnieniu tętniczym, przeciwpadaczkowe, powinny być przyjęte z małą ilością płynów (do 100ml) na 2h przed badaniem.**

Pacjenci zażywający leki zobojętniające kwas solny tzn. leki na zgagę/reflux (Ranigast, Bioprazol, Controloc itd.) powinni je odstawić na 2 tygodnie przed badaniem gastrokopii.

Przebieg badania:

Przy wyborze znieczulenia dożylnego podaje się leki uspokajające na czas trwania badania, zwiększa się tym samym jego komfort. Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na lewym boku. Gastroskop wprowadzany jest przez usta do górnego odcinka przewodu pokarmowego. W czasie procedury wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić badaną okolicę. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest tylko nieco nieprzyjemne, ale zasadniczo bezbolesne, a sam gastroskop nie przeszkadza w oddychaniu. W trakcie badania może zaistnieć potrzeba wykonania **testu ureazowego na obecność bakterii Helicobacter Pylori, pobrania wycinka/ów do badania histopatologicznego lub wykonania zabiegu polipektomii, która polega na usunięciu polipa/ów za pomocą pętli diatermicznej. Powyższe czynności nie są odczuwalne przez Pacjenta, a pobrany materiał przesyłany jest do oceny histopatologicznej.**

Po badaniu:

- Przez 1-2 godziny nie wolno przyjmować posiłków aby uniknąć zadławienia;
- Jeśli wystąpią dolegliwości ze strony jamy brzusznej, czarny stolec lub inne niejasne objawy należy poinformować swojego lekarza;
- Po badaniu w znieczuleniu dożylnym nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych, picia alkoholu przez 24h co związane jest z czasem eliminowania leków z organizmu.

Powikłania:

Powikłania w gastrokopii zdarzają się rzadko, należą do nich:

- Przedziurawienie ściany żołądka lub przełyku (głównie przy polipektomii);
- Krwawienie po pobraniu wycinka do badania;
- Dyskomfort i ewentualne wzdęcia, które ustępują samoistnie;
- Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów i układów;

OŚWIADCZENIE PACJENTA:

Zapoznałem/am się uważnie z przedstawionymi informacjami o badaniu, możliwych powikłaniach oraz zaleceniach i **wyrażam zgodę na wykonanie u mnie badania gastrokopii wraz z testem ureazowym na obecność *Helicobacter pylori* :**

Data:

Podpis Pacjenta:

W razie konieczności **wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na pobranie wycinków histopatologicznych do badania:

Podpis Pacjenta:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na ewentualne wykonanie u mnie polipectomii (usunięcie polipa):

Podpis Pacjenta:

*niepotrzebne skreślić